

ตารางการปฏิบัติงาน
ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกเทศบาลตำบลวังชัย
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1)

.....

วันที่	ชุมชน	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
2 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น.	• ชุมชนวังเก็ง 1 • ชุมชนวังเก็ง 2 • ชุมชนวังเก็ง 3	1. ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก	- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวังชัย
6 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.	• ชุมชนศรีประเสริฐ • ชุมชนประจักษ์มิต • ชุมชนศรีหนองกุ้ง	2. สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลาย 3. ใส่ทรายอะเบท ในภาชนะที่มีน้ำขัง	- รพสต. หนองกุ้ง - รพสต. วังชัย - ประธาน/คณะกรรมการชุมชน
7 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.	• ชุมชนตลาด • ชุมชนโรงเรียน • โรงเรียนอนุบาลพุลสวัสดิ์ • โรงเรียนชุมชนหนองกุ้งวิทยา • โรงเรียนน้ำพอง	4. พ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุงลายตัวต้ง 5. รณรงค์ทำความสะอาดสัอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน	- ประธาน / อสม. ในชุมชนทุกคน
8 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.	• ชุมชนศรีบุญเรือง • ชุมชนหัวหนองกุ้ง1 • ชุมชนหัวหนองกุ้ง 2		
9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.	• ชุมชนหนองนกเขียน 1 • ชุมชนหนองนกเขียน 2 • ชุมชนหนองนกเขียน 3		



ที่ ชก ๖๓๐๓/ว.๓๑๒

สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย
ถนนมุขศิริพล ชก. ๔๐๑๔๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ประธาน อสม.,ประธานชุมชน ทุกชุมชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย เทศบาลตำบลวังชัย ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเกิดอุบัติการณ์ และการระบาดของโรคในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก และการควบคุมโรคไข้เลือดออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้นในครั้งนี้

ในการนี้ จึงขอเชิญท่าน พร้อมแจ้งอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ตามกำหนดการที่แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ คำแก่นคูณ)

นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานประกันสุขภาพ
โทร. ๐-๔๓๔๓-๑๔๑๓ ต่อ ๑๗

๒๗
เกิดเทศบาล.....
รองปลัดเทศบาล.....
หัวหน้าฝ่าย/ผอ.กอง.....
หัวหน้างาน.....
เจ้าหน้าที่.....
วันที่.....





ความรู้ทั่วไปโรคไข้เลือดออก



โรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี มีอยู่หลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ในทุกกลุ่มอายุ พบมากในเด็กวัยเรียน

โรคไข้เลือดออกมีระบาดใหญ่ครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ. 2497 ในประเทศไทยระบาดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2501 ที่กรุงเทพมหานคร จากปีนั้นได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ที่มีภาวการณ์แออัด สดการขนส่งของโรคมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยตลอด หลังจากได้มีการเฝ้าระวังและควบคุมอย่างจริงจัง แสดงว่า พัฒนาการด้านการรักษาพยาบาลดีขึ้น แต่ประชาชนยังขาดความรู้ร่วมมือต่อการป้องกันควบคุมโรค

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อไวรัส มี 4 ชนิด ดังนั้นการติดเชื้อชนิดใดแล้วจะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อชนิดนั้นไปตลอดชีวิต และจะมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเด็งกีอีก 3 ชนิดในช่วงสั้นๆ ราว 3-12 เดือน หลังจากการติดเชื้อแล้ว คนที่เคยติดเชื้อไวรัสเด็งกี ชนิดหนึ่งอาจติดเชื้อไวรัสเด็งกี ชนิดอื่นๆได้ซ้ำไปจากครั้งแรกได้ เป็นการติดเชื้อซ้ำ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก

การติดต่อ

โรคไข้เลือดออกติดต่อถึงกันได้โดยมีหลายทาง เป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ โดยยุงตัวเมียกัดและดูดเลือดผู้ป่วยในระยะไข้สูง และฟักตัวในอุ้งพระนาง 8-12 วัน จากนั้นเมื่อยุงตัวเมียไปกัดคนปกติ ก็จะปล่อยเชื้อไวรัสไปยังผู้ที่ถูกกัด เชื้อเชื้อเข้าสู่ร่างกายคน และนำระยะฟักตัวประมาณ 5-8 วัน (ตั้งแต่ติดเชื้อ - บานที่ตุ่ม 15 วัน) ก็จะให้เกิดอาการของโรคได้ สำหรับเชื้อเด็งกีที่อยู่ในตัวยุงนั้นตลอดชีวิตของยุง คือ ประมาณ 45 วัน

อาการ

หลังจากได้รับเชื้อจากยุงประมาณ 5-8 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการค่อนข้างเฉพาะ 4 ประการ ดังนี้

1. ไข้สูงเฉียบพลัน (38.5 - 40 องศาเซลเซียส) ประมาณ 2-7 วัน หน้าแดง บวมกระพริบตา เบื่ออาหาร อาเจียน ส่วนใหญ่จะไม่คันไม่ปวด
2. มีอาการเลือดออก เช่นเลือดกำเดา แคลง่าย มีจุดเลือดออกเล็ก ๆ ตามแขน ขา ลำตัว รักแร้ มีเลือดกำเดา เลือดออกตามไรฟัน อาเจียนหรืออุจจาระมีสีดำ
3. มีปวดท้อง ส่วนใหญ่จะคล้ายกับได้ประมาณวันที่ 3-4 นับแต่เริ่มป่วย
4. มีภาวะช็อก ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรง เนื่องจากการรั่วของเลือด ออกไปยังช่องปอดและช่องท้อง ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นพรุนๆ กับช็อคลงอย่างรวดเร็ว อาจเกิดได้ตั้งแต่วันที่ 3 ของโรค ผู้ป่วยจะมีอาการ กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตต่ำ แขน ข้อมือจะรู้สึกเย็น หายใจลำบาก อาจมีอาการปวดท้องทึบทั่วท้องหรือปวดท้องเฉพาะที่ อาจมีอาการ ปากเขียว ผิวซีดขาว ๆ ตัวเย็นชื้น จับชีพจรและวัดความดันไม่ได้ ความรู้สึกเปลี่ยนไป และจะเสียชีวิตภายใน 12 - 24 ชั่วโมง ในรายที่ไม่รุนแรง เมื่อได้รับการรักษาในช่วงระยะสั้นๆ ก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

การรักษา

ไม่มีการรักษาที่เฉพาะและไม่มีวัคซีนป้องกัน ให้การรักษาแบบประคับประคอง ตามอาการ โดยให้ยาลดไข้ และนำให้ใช้ยาพาราเซตามอล ให้น้ำให้เพียงพอ และพักผ่อน ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้ส่งต่อผู้ป่วยไปพบแพทย์ เมื่อผู้ป่วยไข้เลือดออก จะมีไข้สูง 4-5 วัน (พาราล็อก 70) ซึ่งวันที่เป็นระยะวิกฤต/ช็อกจะตรงกับวันที่ไข้ลง หรือไข้ต่ำกว่าเดิม จึงพิจารณาแยกแยะว่าวันที่ 3 ของโรค เป็นวันที่เร็วที่สุดที่ผู้ป่วยไข้เลือดออกมีโอกาสรักษาได้ และระหว่างที่ผู้ป่วยมีอาการช็อก จะมีสติสัมปชัญญะขาดได้ จะดูแลผู้ป่วยที่มีแต่ความอ่อนแอเท่านั้น ให้รีบนำผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลระดับสูงทันที

การป้องกันโรค

โรคไข้เลือดออก สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว การป้องกันควบคุมโรคที่สำคัญ จึงต้องไม่ปล่อยยุง โดยเฉพาะในผู้ป่วย โดยการลดจำนวนยุงตัวเต็มวัย และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ซึ่งจะต้องทำให้ครอบคลุม ทุกครัวเรือน ต่อเนื่องและสม่ำเสมอตลอดทั้งปี มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้

1. วิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

คือ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อลดจำนวนยุงตัวเต็มวัยและแหล่งเพาะพันธุ์ให้ต่ำมากที่สุด โดยมีข้อแนะนำสำหรับสถานศึกษา ได้แก่

- ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานศึกษา ทุก 7 วัน
- ให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักเรียนเกี่ยวกับ วงจรชีวิตของยุง การแพร่เชื้อ

และวิธีป้องกัน

- 1.1 ทางกายภาพ ได้แก่ การปิดภาชนะเก็บน้ำด้วยฝาปิดเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายเข้าไปวางไข่ อาจจะใช้มุ้ง ผ้าตาหรือพลาสติกปิดและปิดไว้ภาชนะที่ยังไม่ใช้ประโยชน์ควรคว่ำ

มีโทรทัศน์น้ำ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สิ่งของเหลือใช้ เช่น กระดาษ กระป๋องนมหรือสิ่ง แฉกแตกไม่สมควรเก็บรักษาทุก 7 วัน วิธีการเหล่านี้ต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดทั้งปี

- 1.2 ทางชีวภาพ คือ การปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะเก็บกักน้ำ เช่น โถงปูน 2-4 ตัว หมันดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา วิธีนี้ทำแบบเดิมและปลอดภัย

- 1.3 ทางเคมี โดยใช้ทรายอะเบทในภาชนะเก็บกักน้ำ ใช้วิธีเฉพาะภาชนะที่ไม่สามารถปิดหรือใส่ปลากินลูกน้ำได้

2. วิธีการลดยุงตัวเต็มวัย มีดังนี้

- 2.1 ใช้ใบเตย ใช้ใบมะนาวสมุนไพรหรือผงขี้เือง ฉีดพ่นในลูกยุง

- 2.2 การพัฒนาการจัดการยุงตัวเต็มวัย เป็นวิธีควบคุมยุงที่ปลอดภัย แต่ไม่ผลระยะสั้น ราคาแพง ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ เพราะเคมีภัณฑ์ อาจเป็นพิษต่อคนและสัตว์เลี้ยง จึงควรใช้เฉพาะเมื่อจำเป็น

3. การป้องกันยุงกัด โดยนอนในมุ้ง ทายากันยุง ใช้สมุนไพรพัฒนาผิว ผิวเคลือบผิวขัด หมักเนื้อที่ปิด ทับ ขัน ขัน



ยุงลาย

credit - wikipedia